

胤產全書

胎產全書卷四

金壇王肯堂字泰父

海陽張受孔心如父系定

海陽姚學顏伯愚父校閱

瘕瘕類

瘕者筋脉拘急也瘕者筋脉張弛也經云肝主筋而藏血蓋肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水此症因產血過多陽火熾盛筋無所養而然耳

至聖防風湯 治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍

惚狂言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚効  
此藥溫和不虛人

秦艽

獨活

麻黃

去節

半夏

湯泡七次切片

防風

各二兩

升麻

防己

白朮

石膏

煨

白芍藥

黃芩

甘草

當歸

遠志

人參

各一兩

右爲粗末入半夏片令勻每服四錢水二盞生薑  
七八片煎至一盞去渣取清汁六分入麝香末少  
許食後臨卧帶熱服

海藏愈風湯 卽華陀愈風湯 治前症

增損柴胡湯 治產後感異証手足痺搐涎潮昏悶

柴胡 錢三 黃芩 錢二 人參 甘草 炙

半夏 錢各一 知母 錢一 石膏 錢二 黃芪 錢二

右咬咀分二服水二盞姜三片束二枚煎八分服

秦艽湯 前症已去次服此藥去其風邪

秦艽 芍藥 柴胡 錢各一 炙甘草 錢一

黃芩 防風 錢各一 人參 半夏 錢各一

右咬咀分二服每服水二盞姜三片煎八分食遠

服

拘攣類

產後中風筋脉四肢攣急是氣血不足臟腑俱虛  
勞役虛損正氣未復爲風所乘風邪冷氣客於皮  
膚經絡令人頑痺不仁風氣入於筋脉挾寒則攣  
急也

芩薊湯 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強  
急

芩薊

羌活

當歸

酸棗仁

炒

羚羊角屑

各半

防風

牛旁子

各一兩

桂心

赤芍藥

各半兩

右咬咀每服八錢水一大盞半煎至一大盞去滓

溫服

防已膏 治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痺並

宜用之

漢防已

去皮半斤

茵芋

五兩

右咬咀用酒五升浸藥一宿取猪肪脂一斤文武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以

熱手不住摩膏上

不語類

人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於  
心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則  
舌亦強矣故令不語

七珍散

人參

石菖蒲

生地黃

川芎

各一兩

細辛

一錢

防風

辰砂

另研各半兩

右爲極細末每服一錢薄荷湯調下無時

孤鳳散 治產後閉目不語

用生白礬末每服一錢熱水調下

參蓮飲 治產後不語

人參 石蓮肉不去心 石菖蒲各等分

右每服五錢水煎

逐血補心湯 治產後失音不語

紅花 赤芍藥 生地黃 桔梗 蘇葉

前胡 茯苓 防風 牛胆南星 黃連

粉葛各二錢 當歸三錢 薄荷 人參



升麻

各一錢半

半夏

二錢五分

甘草

一錢

右剉爲散分作二服每服水一鍾半姜三片煎至

七分空心服渣再煎

狂言譫語顛狂乍見鬼神類

夫產後語言顛倒狂言譫語如見鬼神產後因驚

敗血衝心昏悶發狂或因產傷血脈心氣既虛敗

血停積上干於心心中煩躁言語顛錯卧起不安

乍見鬼神

荷葉散 產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者

乾荷葉 生地黃 牡丹皮等分

三味濃煎湯調生蒲黃末二錢匕一服即定

烏金散 治產後三五日或半月之間忽狂言亂語

目見鬼神等證

當歸 遠志肉 川芎 酸棗仁 白朮

赤芍 香附 辰砂另研人 熟地 羌活

防風各二錢 茯神二錢 半夏三錢 全蝎

麥門冬 人參 牛膝 天麻各一錢 耳草九分

陳皮 白芷各一錢半

右剉散作二服水一鍾生姜三片葱二枝入金銀同煎一碗溫服

四物補心湯

治產後言語恍惚顛倒錯亂

當歸

五錢

川芎

生地黃

白芍藥

茯神

半夏

桔梗

白朮

各四錢

陳皮

三錢

甘草

一錢

右剉爲散分作六服每服用水一鍾姜三片煎至

七分空心溫服

有熱加酒炒黃連二錢無熱不

用

茯神散

治產後血邪心神恍惚言語失度睡卧不

安

茯神

一兩去  
皮木

人參

龍齒

研

琥珀

研

赤芍藥

黃芪

牛膝

各七  
錢半

生地黃

一兩  
半

桂心

半兩

右爲末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

栢子仁散

治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪

氣攻心

栢子仁

遠志

去心

人參

桑寄生

防風

琥珀

另研

當歸

焙

生地黃

焙

甘草

各等分

右爲粗末先用白羊心一個切片以水一大盞半  
先煮至九分去羊心入藥末五錢煎六分去滓服  
驚悸恍惚類

產後臟虛心神驚悸由體虛心氣不足心之經爲  
風邪所乘或恐懼憂迫亦令心氣受於心邪若驚  
不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能動診其  
脉動則爲驚弱則爲悸令人心神恍惚不定也

白茯苓散 治產後心神驚悸言語失常心神昏憤

白茯苓

熟地黃

人參

各一兩

遠志

去心

白芍藥 黃芪 桂心 當歸炒 甘草炙

麥門冬各一兩 石菖蒲 桑寄生各七錢半

右為咬咀每服八錢水一大盞半生姜五片束三

枚竹葉三七片煎至一大盞去渣溫服

產乳七寶散 初產後服之調和血氣補虛安心神

鎮驚悸

硃砂飛 桂心 當歸 川芎 人參

白茯苓 羚羊角燒存性各二錢 乾姜一錢

為細末每服一錢用羌活豆淋酒調下不飲酒清

米飲調下

琥珀辰砂散 治血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂

琥珀

沒藥

並細研

當歸

各等分

右爲細末每服二錢空心白湯調下日三服

千金方 療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚等

因心虛所致

茯苓

三兩

芍藥

二兩

甘草

桂心

當歸

各一兩

生姜

一兩半

麥門冬

去心一升

大棗

三十枚

右爲散水三升煎取一升去滓分作兩服

天麻丸 療產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻

硃砂

飛水

防風

羌活

各一兩

僵蚕

炒七錢半

乾蝎

炒

白附子

炮

五靈脂

炒各半兩

雄雀糞

炒

牛黃

另研各二錢半

右爲細末糯米飯爲丸如梧子大每服二三十九

薄荷酒送下日進三服

發熱煩渴類

產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂



附若作渴面赤宜用當歸補血渴若誤認爲火症  
投以涼劑禍在反掌

三之一湯 治產後虛勞發熱日久不安

柴胡 黃芩 人參 半夏 川芎 當歸

芍藥 熟地 甘草 各一錢半

作一貼水二鍾姜三片紅朮一枚煎一鍾服

三分散 治產後日久虛勞發熱

川芎 當歸 芍藥 熟地黃 白朮

白茯苓 黃芪 各一錢 柴胡 人參 半夏

甘草 各半錢

右作一服水二鍾生姜三片紅棗一枚煎至一鍾食前服

加味逍遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸 白芍藥 乾薑 各二錢 生地黃

川芎 黃芩 各一錢半 人參 九分 麥門冬 九分

柴胡 一錢 烏梅 二錢 甘草 六分

右剉散分作二服用水一鍾煎七分空心服

一產後發熱多屬虛寒惟乾姜加入補藥中神效

此丹溪法也

沒藥丸 治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥

研

薑

延胡索

乾漆

炒

當歸

桂心

牛膝

牡丹皮

乾姜

各等分

右爲細末醋煮面糊丸如梧桐子大煎麴湯下十

丸至十五丸

竹葉湯

治產後短氣欲絕心中煩悶

竹葉

切細

麥門冬

小麥

各升

甘草

一兩

生姜

二兩

大棗

十二枚

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去滓納余藥者取三升去滓溫服虛悸加人參二兩少氣加糯米五合

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹

升一

人參

茯苓

甘草

各一兩

黃芩

三兩

右咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

人參當歸湯

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

主內熱令人心悶短氣自汗頭痛

熟地黃 人參 當歸身 肉桂 麥門冬心去

各二錢 白芍藥炒二錢半 血熱甚者加生地黃二錢

水二鍾糯米二合竹葉十片煎一鍾食遠服

產寶方 治產後大渴不止

蘆根切一升 瓜蒌 人參 甘草 茯苓各二兩

大棗二十枚 麥冬四兩

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑卽瘥忌

菰菜

黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩

麥門冬

各等分

右咬咀每服三錢水盞半煎八分去滓溫服

竹葉歸芪湯

治胃氣虛弱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉

一錢半

黃芪

二錢

白朮

人參

當歸

各一錢

麥門冬

七分

甘草

炒五分

右水煎服

玄胡索散

治產後失血渴不止

鮮金

乾葛

桂心

青皮

枳殼

玄胡索

右等分以好醋浸一宿焙乾末之每服二錢陳皮

湯調下日三夜一

回津丸 產後虛渴去血多津液少腎氣虛引飲無  
度當養血通氣回津補氣則安

白芍藥

澤瀉

茯苓

川芎

各一錢

當歸

白朮

五味

各二錢

烏梅肉

一錢

右爲細末煉蜜丸熱水吞下三十九 一方加耳

草

二錢

訶子

錢

自汗盜汗類

產後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表

實陽氣獨發於外故汗出也血爲陰產則傷血是爲陰氣虛也陽加於陰故令汗出陰陽虛弱不復則汗出不止多產後多汗遇風變成瘧縱不成瘧亦虛之短氣身體柴瘦口乾燥久則經水斷絕由津液竭也

全生活血湯 治發熱自汗盜汗目眩暈四肢無力口乾頭暈行步欹側

升麻

芍藥

炒各三錢

柴胡

當歸

枳殼

羌活

獨活

葛根

甘草

炒各二錢

川芎



藁本

各一錢半

生地

熟地

各一錢

細辛

蔓荊子

各五分

紅花

三分

右每服五錢水煎熱服

麻黃根散

治產後虛汗不止

當歸

黃芪

麻黃

牡礪

煨爲粉

人參

粉草

各等分

右吹咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

經効方

治產後汗出不止

黃芪

十二分

白朮

牡礪

煨

茯苓

防風

麥冬去心

生地黃各八分

大棗七枚

右咬咀水二升煮取七合去滓空心分溫兩服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煨研

小麥麴炒令黃色

右等分和勻煮生豬肉汁調下二錢無時服

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參 當歸各等分

右爲末以猪腰子一隻去脂膜切小片子以水三升糯米半合葱白二條煮米熟取清汁一盞入藥

二錢煎至八分溫服

當歸六黃湯

治氣血虛熱盜汗不止心血不足加

酸棗仁

炒

當歸

熟地

黃芪

炒各二錢

生地

黃柏

黑炒

黃芩

炒黑

黃連

炒黑各一錢

右水煎服

往來寒熱類

產後血氣虛損陰陽不和敗血不散能令乍寒乍熱陰勝則寒陽勝則熱陰陽相乘或寒或熱若因

產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於  
肺則熱入於脾則寒若誤作癰治之則謬矣  
加減烏金散 治產後寒熱似癰

厚朴 柴胡 黃芩 麻黃 各二錢 陳皮

當歸 川芎 桔梗 茯苓 各一錢半 桂枝

蒼朮 白芷 枳殼 各一錢 羌活 草果

半夏 各二錢 甘草 九分 白芍藥 熟地黃 各一錢半

右剉爲散分作兩服每服用水一鍾半生姜三片  
葱三莖煎一鍾服 有汗加當歸 川芎 白芍

熟地 有脹倍厚朴 陳皮 有熱加柴胡

黃芩 有寒加蒼朮 草果 桂枝 有痰多

半夏 桔梗 茯苓 有頭痛多川芎 白芷

羌活 有瀉去枳殼 甘草不用

增損柴胡湯 治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮 川芎

白芍藥 各等分

右每服三錢姜五片水二枚同煎食後日二服

熱地黃散 治產後羸勞皆由體虛氣力未壯勞復

四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃

人參

白芍藥

白茯苓

白朮

續斷

各兩

黃芪

桂心

五味子

當歸

川芎

各七錢半

右咬咀每服四錢姜三片棗一枚水煎服

黃芪丸

治產後蓐勞寒熱進退頭目炫痛骨節痠

疼氣力羸乏

黃芪

鱉甲

當歸

炒各一兩

桂心

白芍藥

續斷

川芎

牛膝

茯苓

沉香

柏子仁

枳殼 各七錢半

五味子

熟地黃 各半兩

共爲細末煉蜜丸如梧子大每服四五十九食後

粥飲下

瘧類

產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作或因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏

審証而治

草果飲子

治產後瘧疾寒熱相半者或多熱宜此

半夏 湯泡

赤茯苓

甘草 炙

草果

炮去

川芎

陳皮

白芷

各二錢

青皮去白

良姜

紫蘇

各一錢半

乾葛

四錢

右咬咀每服三錢水一盞姜三片枣二枚同煎至

七分去滓當發日侵晨連進三服無有不安

生熟飲子

治產後瘧多寒者

肉豆蔻

草果仁

厚朴

半夏

陳皮

甘草

大棗

去核

生姜

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕綿帛裹

煨令香熟去帛與一半生者和勻每服五錢用水



二盞煎至七分食前一服食後一服

七寶飲 久而不已者用此截之方見胎前瘕

瘵勞虛羸類

產後瘵勞者此由生產日淺血氣弱飲食尚未平復日月未滿氣血虛羸將養失所風冷客之風冷搏於氣血則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦顏容憔悴食飲不消風邪感於肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛柴衛風邪流注臑脇盜汗顏發寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重着床此

則蓐勞之候也

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如癰四肢疼痛面色痿黃名曰蓐勞一

猪石子

一雙去膜脂四破

香豉

一方無此有知母

葱白

切

粳米

當歸

芍藥

各二兩

右咬咀分兩劑每劑用水三升煮取一小碗去滓分三服

猪腰子粥

治蓐勞發熱

用猪腰子一枚去白膜切作柳葉片以鹽酒拌先

用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盤底以熱粥蓋之如作蠶生狀空心服

人參驚甲散 治勞傷血氣虛損勞動成癆其狀虛

羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發欬無常夜有盜汗寒熱如癰背膊拘急沉困在床服

此大効

人參 桂心 當歸 桑寄生 白茯苓

白芍藥 桃仁 麥門冬 熟地黃 甘草

兩 續斷二錢 牛膝七錢 驚甲

半

半

各半

黃芪各兩

右爲細末每服先以猪腰一對去筋膜以水兩大  
盞生姜半錢束三枚煎至一盞去猪腎姜束然後  
入藥末二錢葱白三寸烏梅一個荆芥五穗煎至  
七分去澤空心晚食前溫服此藥神効

牡丹散 治產後虛羸發熱自汗欲變蓐勞或血氣  
所搏經候不調或寒熱羸瘦

白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮

人參各半兩

沒藥

桂心各二錢

牡丹皮三錢

右爲細末每服二錢水酒各半盞開元錢一枚麻油蘸之同煎七分去渣通口服煎不得攪吃不得吹

黃芪煮飲

產後蓐勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒

壯熱四肢痠痛心煩頭痛

鱉甲

醋煮

黃芪

各二兩

桂心

當歸炒

桑寄生

白茯苓

白芍藥

人參

熟地

麥門冬

甘草

炙各半兩

牛膝

七錢半

右爲細末每服用豬石子一對去脂膜切破先以

水一盞入姜半錢束三枚煎至七分去石子姜束却下藥五錢更煎至四分去滓空心晚食前溫服  
二滓併煎

十全大補湯 治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或自汗盜汗便血吐血或大便秘不實飲食少思或胸腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參 白朮 白茯苓 黃芪 當歸

熟地 酒洗 白芍藥 炒 川芎 各一錢 肉桂

甘草 炙 五分

右姜朮水煎服

黃芪建中湯

治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪

炒

肉桂

各一兩

白芍藥

炒二兩

甘草

炙

每服五錢姜朮水煎服日二三服虛甚加附子

當歸羊肉湯

治產後雖無疾但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉

一斤去脂水一斗煮取八升去肉

當歸

五兩

黃芪

四兩

生姜

六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分爲四服若覺惡

露不盡加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加朮

芡一兩有氣加細辛二兩有熱加生地黃汁二合  
痞悶類

產後榮衛大虛血氣未定食施太早胃不能消化  
麴毒結聚於胃脘上薰胸中是以口乾燥渴心下  
痞悶醫者不識認為腐膈壅滯以藥下之萬不得  
已但服此藥

見硯丸

姜黃

炒

三稜

醋炒

華澄茄

陳皮

去白

良姜

人參

蓬莪茂

酒炒等分



右爲細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊爲丸如梧  
子大每服三十丸蘿蔔湯下白湯亦可

生地黃湯 產後煩悶虛熱血傷風邪乘之氣乃不  
宣而痞塞生熱煩疼口乾悶多好飲水

生地黃 清酒五升 生姜汁三合 當歸一兩爲末

童子小便一升

右和煎三四沸分四服藥消進食食消進藥

### 腹脹類

產後腹脹滿悶嘔吐不定此因敗血散於脾胃脾

受則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受  
納水穀而生吐逆若與尋常治脹止吐藥治更傷  
動正氣但服

抵聖湯入生姜半兩焙乾水煎 方見胎前腹脹

局方 平胃散 加人參亦可

水腫類

產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢  
留滯日久却還不得腐爛如水故令面黃四肢浮  
腫醫人不識便作水氣治之凡治水多用導水藥

極虛人產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致夭枉但調經散血行腫消則愈

小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

細辛

麝香

各半錢

右爲細末每服半錢姜汁溫酒各少許調停服

乾漆散

治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

乾漆

大麥蘖

等分

右各爲細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾

添如此填滿用塩泥固濟火煨通赤放冷研爲散  
但是產後諸疾熱酒調下二錢

枳木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名

曰氣分

白朮

三兩

枳實

一兩半

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服  
腹中與卽當散也

奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生姜

三兩取汁

白麩

三兩

大半夏

七枚

右以生姜汁拌麴褰半夏爲七餅子煨熟爲末水調一盞小便利爲効

張氏方 治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防已

等分

右爲末每服二錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

加味八物湯 治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參 白茯苓 熟地黃 小茴香

各一錢

白朮 川芎 當歸 白芍藥

各四錢

香附子 甘草 黃芩 柴胡

各五錢

各一錢

右剉散分作六七服每服水一盞半姜三片煎至七分空心熱服盡此藥方服調經丸若肚痛加延

胡索乾漆枳殼

各三錢

若嘔吐惡心加良姜砂仁

各二錢

錢

若手足麻痺加肉桂

一錢半

若咳嗽加五味子款

冬花杏仁

積聚類

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調產後血氣傷於臟腑臟腑虛弱爲風冷所乘與血氣相結故成積聚癥塊

芍藥湯 治產後諸疾不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥 一斤 黃芩 茯苓 各六兩

右剉散每以半兩水煎溫服日三

丹溪心法 產後消血塊

滑石 三錢 沒藥 血竭 各二錢

右爲細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂爲細末

麩糊丸白木湯陳皮湯任下

又方 消血塊

香附童便浸 桃仁去皮留尖等分

右爲細末醋糊丸

產寶方 療血瘕痛無定處

童便三升 生地黃汁 生藕汁各一升

生姜汁三升

右先煎前三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀餚每服取一合暖酒調下

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹痛

川芎 當歸 乾姜 赤芍藥各等分



右爲細末每服二錢食遠用溫酒調服

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或  
成寒熱四肢羸瘦煩疼

桂心 當歸 赤芍藥 牡丹皮 沒藥

檳榔 各半 青皮 乾漆 炒烟盡各七錢半 大黃

桃仁 去皮尖 三稜 煨 玄胡索 鱉甲 酥炙

厚朴 製各一兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三四十九食前  
溫酒送下

霍亂類

產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消腸胃  
風冷陰陽不和穢濁相干氣亂於腸胃之間真邪  
相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也

立定散

治產後霍亂吐利

煩渴手足厥冷

白朮

橘紅

麥門冬

去心

乾姜

人參

各一兩

甘草

半兩

爲粗末每服四錢水一盞生姜五片煎去滓溫服

溫中散

治產後霍亂吐瀉不止

人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾姜

各一兩

厚朴

製兩半

右爲粗末每服三錢水煎服

附子散 療產後霍亂不止手足厥冷

附子

炮

白朮

當歸

吳茱萸

洗

桂心

人參

丁香

橘紅

甘草

各半兩

右爲細末每服二錢粥飲調下

龍肝散

吐逆不受湯藥

以伏龍肝細末三錢米湯調下卽受

嘔吐類

夫胃爲水穀之海水穀之精以爲血氣榮潤臟腑  
因產傷動臟腑有時氣乘腸胃腸胃燥澁其氣則  
逆故嘔逆不下食也

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜  
服此藥

訶子肉

一兩半

人參

一兩

甘草

半兩

右三味爲細末別以半夏半分生姜一分薤白二  
七莖水一大盞煎至六分去滓分爲兩服

立効方 療產後嘔逆不止

橘皮

一兩

半夏麴

甘草

各半兩

藿香

二兩

右爲細末每服二錢水一盞半姜三片煎六分溫服

石蓮散 治產後咳逆嘔吐心怔目暈

石蓮子

去壳一兩半

白茯苓

一兩

丁香

五錢

右爲細末米飲調三錢無時服

又方 內熱嘔吐服前藥不効

枇杷葉

去毛蜜炙

茅根

各五錢

煎濃湯入蘆根汁半盞和勻服

吃逆類

肺主氣五臟六腑俱稟於氣產後氣血臟腑俱傷而風冷搏於氣氣則逆上脾虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣逆而不順則吃逆也  
丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香 白豆蔻仁

各半兩

伏龍肝

一兩

右爲細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散

見嘔吐

產寶方

療產後吃逆三日不止欲死方

桂心

半兩

薑汁

三合

右同煎取三合以大火炙手摩背熱時塗藥汁盡

妙

羌活散

治吃逆

羌活

附子

炮

懷香

炒各半兩

木香

白薑

炮各二錢半

右五味爲末每服二錢水一盞薑一捻煎十數沸

熱服一服卽止

又方 治產後吃逆

用乾柿一個切碎以水一盞煎六分熱呷之

咳嗽類

肺主氣產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風  
或熱或寒或濕皆令咳嗽也若產後吃鹽太早而  
咳嗽者難治

旋覆花湯 治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐卧

不寧



旋覆花 赤芍藥 荊芥穗 半夏麴 前胡

甘草 炙 茯苓 五味子 杏仁 去皮尖

麻黃 各等分

右咬咀每服四錢水一盞半生姜三片茶一枚煎

至七分去滓食前溫服有汗者去麻黃

知母飲。治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服

此藥若傷風咳嗽却以尋常傷風藥主治

知母 貝母 白茯苓 人參 各二錢 桃仁

杏仁 並生去皮尖各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

經効方 療咳嗽多痰喘氣急

前胡

五味子

紫苑

貝母

各一兩

桑白皮

茯苓

各二兩

淡竹葉

二十片

右咬咀水二升煎至八合去滓食後分二服

百合散

療產後咳嗽氣急

百部根

苦梗

各六分

桑白皮

二十分

乾百合

赤茯苓

各八分

右咬咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

喘類

產後所下過多，榮血暴竭，衛氣無主，獨聚肺中，故令嗽也。此名孤陽絕陰，爲難治。若惡露不快，敗血停凝上薰於肺，亦令喘急。但服奪命丹，血去喘自定。

血竭散 治產後敗血衝心胸滿上喘，命在須臾，宜服。

真血竭

如無紫礮代

沒藥

右等分，研細。每服二錢，用童便合好酒半大盞煎。

一沸溫調下方產下一服上床良久再服其惡血  
自循經下更不衝上免生百病

參蘇飲 治產後血入於肺而黑發喘欲死者

人參

一兩  
爲末

燕木

二兩

右以水兩碗煮取燕木一碗以下去渣調參末隨  
時加減服神効

旋覆花湯 見前咳嗽

若傷鹹冷飲食而喘者宜見睨丸 見前痞悶類

大補湯 治產後百日外面青浮腫唇口氣急有汗

乃大虛之症急用服此

當歸頭 大川芎 大白朮 白芍藥

白茯苓<sup>多</sup> 人參<sup>多</sup> 黃芪<sup>多</sup> 五味子

熟地黃 乾薑 甘草<sup>少</sup>

右剉散水煎服如痰不退加川烏木香另磨入服  
有瀉加訶子肉豆寇栗殼

五味子湯 治產後喘促脉伏而厥

五味子<sup>炒</sup> 人參 杏仁<sup>各二錢</sup> 麥門冬<sup>去心</sup>

陳皮<sup>各一兩</sup>

右姜三片、束二枚、水煎服。

血崩類

產卧傷耗經脉未得平復、勞役損動致血暴崩淋瀝不止、或因酸鹹不節傷壺榮衛衰弱亦變崩中。若小腹滿痛、肝經已壞為難治、急服固經丸以止之。

固經丸

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

炒

木賊

各半兩

附子

一枚炮

右爲末陳米飯和丸如梧子大每服二十九食前  
溫酒下米飲亦得

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮

百枚燒  
有性

棕櫚

燒存  
性

當歸

桂心

各一  
兩

鯉魚鱗

燒

川芎

各七  
錢

檳榔

二  
枚

右爲細末每服三錢煨姜酒調下如未止更進一  
服或非時血崩無藥可治但進三服卽止

白芍藥散

治產後崩中下血淋漓不絕黃瘦虛損

白芍藥

牡蠣

乾薑

熟地黃

桂心

黃芪骨血 鹿角膠 龍骨各一錢 烏賊血骨

右爲末每服二錢食前溫酒下

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂各一兩半 續斷 一川芎 當歸

甘草 丹參各一兩 龍骨 鹿茸酥炙 魚骨諸

烏賊骨血 鱉甲炙各二兩 共爲細末

右煉蜜爲丸梧桐子大空心溫酒一日二三十丸

菖蒲酒 治產後崩中下血不止

菖蒲 一兩半 細剉



以酒二盞煮取一盞去滓分三服食前

月水不調類

產後月水不調者由產傷動血氣虛損風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故血或多或少或在月前或在月後故名不調也

琥珀調經散 治產後經脉不調四肢煩疼飲食全

少日漸羸瘦

琥珀 牛膝 生乾地黃 當歸 各一兩 桃仁

赤芍藥

各半兩

右爲細末每服三錢水一盞姜三片煎六分去滓服

姜黃丸 治產後虛乏不足心胸短氣腹內緊急腰

背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃 當歸 熟地黃 牡丹皮 厚朴製

桂心 川芎 續斷 桃仁 白朮各一兩

赤芍藥 木香各七錢半 羚羊角屑二錢半

右爲細末煉蜜如梧桐子大每服三十丸食前服

溫酒下

瀉痢類

產後腹痛瀉利者皆因產後腸胃虛怯寒邪易侵  
若未清月飲冷當風乘虛襲留於胃膜散於腹脇  
故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化  
洞泄腸鳴或下赤白胠脇填脹或痛走不定急服  
調中湯立愈若醫爲積滯取之禍不旋踵

調中湯

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子

炮

川芎

各兩

甘草

半兩

右爲粗末每服三錢匕水三盞煎一盞去滓熱服

茯苓湯 治產後泄

茯苓 川芎 黃芩 白朮 乾薑 滑石

陳皮 芍藥 炒各等分

右水煎服之

人參白朮散 治產後泄瀉

人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏

製朴 砂仁 當歸 神曲 炒

姜三片水煎服

歸芎散 治產後身熱腹痛泄瀉

當歸 川芎 白芍藥 玄胡索 砂仁

甘草 白朮 神曲 茯苓 乾姜皮

水姜煎服

赤白痢疾類

產後痢疾者由產勞傷臟腑不足勞動大早誤食  
生冷風冷乘虛誤入腸胃生冷難化之物傷於脾  
胃皆令洞泄水瀉甚者變爲痢也若血滲入大腸  
則爲血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或如

魚腦得熱則赤黃或爲驟血若冷熱相搏則下赤  
白痢或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食  
不進日夜無度產後本虛久痢不止必至危篤當  
慎治之

急救散 治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

熟地黃

各一兩

甘草

當歸

各三兩

右咬咀水煎分二服空心飲

黃連丸

治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連四兩 阿膠 蒲黃 槐子仁各一兩

當歸二兩半 黃芩 黃柏各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服六七十丸米飲

吞下日三夜一

白頭翁散 治產後下痢虛極者

白頭翁 阿膠各二兩 黃連 黃柏

秦皮各三兩 甘草二兩

右以水七升煮取二升半納膠令消盡溫分三服

神馬飲 治產後血痢小便不通臍腹疼痛

用生馬齒莧搗汁二大合煎一沸下蜜一合調頓服

又方 產後痢日五十行者

取木裏蛀虫糞屑炒黃急以水沃之令稠稀得所服之卽瘥

經効方 治產後久痢津液涸渴不止

龍骨<sub>十二分</sub> 厚朴 茯苓 黃芪 麥門冬

人參<sub>各八分</sub> 生薑<sub>六分</sub> 大棗<sub>十四個</sub>  
<sub>並細剉</sub>

右以水一大升煮取七合空心分兩服



當歸飲 產後痢疾

當歸 川芎 芍藥 香附炒 陳皮

茯苓 甘草 砂仁 澤瀉 白朮 神曲炒

乾姜炒 木香不見火為末餘藥煎熟入末服

右水煎服

神龜散 治產後胎前痢疾

敗龜甲一枚米醋炙研為末醋湯調下

又方 婦人臨產痢疾

山梔不拘多少燒灰為末空心溫服熱水調下

錢甚者不過五服

大便秘澀類

產臥水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥糞在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之誤爲有熱投之寒藥則陽消陰長變証百出性命危矣

麻仁丸

麻仁

研如泥

枳殼

人參

各一兩

大黃

半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十九  
未通漸加丸數不可太過

四物青皮湯

當歸 川芎 生地 芍藥

青皮

去白

水煎服甚効

神應散 產後秘結不通膨滿者氣急坐卧俱難用

大麥蘖炒黃爲末酒下一合神効

大小便不通類

產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血水俱

下津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃故令大小便不通也

桃仁散 治膀胱氣滯血澁大小便秘

桃仁 葵子 滑石 檳榔

各等分

右爲細末每服二錢空心葱白湯調下

車前散 治產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 生地黃

芍藥

各一兩五錢

右爲細末空心米飲服方寸匕忌麴蒜

乳飲 治產後大小便不通諸藥不應者令飲牛乳  
人乳尤善一日稍通三日而痊

淋閼類

產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱  
則小便澀痛故謂之淋有因產損氣虛則挾熱熱  
則搏於血卽流滲於胞中故血隨小便出而爲血  
淋淋者淋瀝之謂也

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根

八兩

瞿麥穗

白茯苓

各四兩

葵子

人參

各二兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各二兩

紫貝

煨十枚

石首

魚頭中石二十枚燒

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片灯心二十

莖煎至七分去滓溫服亦可為末木通煎湯調下

二錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散 療產後淋

滑石

一兩二錢半研

通草

車前子

葵子

各一兩

右為末以漿水調服方寸匕至二七為妙

張不愚方 療產後小便不通淋悶

陳皮一兩去白爲末

空心溫酒調下二錢一服便通

魚齒散 治產後淋小便痛及血淋

白茅根五兩 瞿麥 車前子各二兩

鯉魚齒一百枚爲末 通草三兩 冬葵子二合

右水二升煮取一升入魚齒末空心服

灸法 產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未

產之時因積冷氣遂致產時尿胞運動不順

用鹽於產婦臍中填與臍平用葱白剝去粗皮十

餘根作一縛切作一指厚安塩上用大艾炷蒲葱并子大小以火灸之覺熱氣直入腹中卽時便通神驗

小便類

產後小便數者乃氣虛不能制或因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝或因膀胱氣虛而小便頻數或膀胱陰虛而小便淋瀝隨經補治之

葉鰾蛸散 治產後小便數及遺尿

葉鰾蛸

三十枚煨

鹿茸

酥炙

黃芪

各三兩

牡礪

煨



人參 厚朴 赤石脂 各二兩

右爲末空心粥飲調下二錢

括蕒湯 療產後小便數兼渴

栝蕒根

甘草

並炙

黃連

生姜

各二兩

括蕒根

三兩

人參

三兩

大棗

五十枚

右細切用水七升煮二升半分三服忌豬肉冷水

又方 治產後小便數及遺尿

益智仁爲末米飲調下

小便不禁類

婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無禁或因收  
生不謹損破尿管致患此疾

止遺方 產後尿不禁而微浮畧發熱于午後此膀胱為坐婆所傷

黃芪

歸身尾

芍藥

各一錢半

白朮

一錢

人參

陳皮

各五分

甘草

炙少許

右水煎熱服之

廣濟方

治產後小便不禁

鷄尾毛燒存性酒調下一匕日三服

千金方 治產後遺尿不知出

白薇

芍藥

各等分

右爲末酒服方寸匕日三

固脬散 治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

黃絲絹

自然黃者染色不用三尺以炭灰汁煮過以清水洗去灰令淨入黃蠟半兩

案一兩茅根二錢馬尻勃末二錢

右用水二升再煎至一盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲作聲無驗

補脬飲 治產後傷動脬破終日不小便但淋濕不

乾

生絲絹

黃色者  
一尺

白牡丹皮根木

白茯苓

各一錢

用水一碗煎至絹爛如飴服之勿作聲作聲無効

鷄內金散

治產後溺床失禁

以鷄胫脰一具并腸洗燒爲末酒調服方寸匕

小便出血類

產後小便出血者因氣虛而熱乘之血得熱則流

散滲於胞內故血隨小便出

血餘散

治小便利血

亂髮

湯洗垢  
膩淨

右燒研爲末米飲調服方寸匕

又方

用滑石研髮灰等分每服一錢地黃汁調下

雀氏方 療產後血滲入大小腸

蜜

一大合

車前子

搗汁  
一升

右相和煎沸分兩服

補遺方 治產後小便出血

川牛膝

去  
蘖

水煎服

又方

生地黃汁

升半

生姜自然汁

合半

右相和服之

陰脫產門不開類

婦人趨產勞力勞熱太過致陰下脫若脫肛狀及  
陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續  
續小便淋露

硫黃散

治產後勞傷陰脫

硫黃

烏賊魚骨

各半兩

五味子

三錢半

右爲末摻患處

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁

去皮尖

枯礬

五倍子

各等分

右以下二味爲末研桃仁爲膏拌勻傳之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃

四兩

吳茱萸

兔系子

各一兩半

蛇床子

一兩

右每服四錢水一碗煎數沸濾滓洗玉門日再洗

熨法

單炒蛇床子乘熱布裹熨患處亦治產後陰痛

歸苓散 治陰下脫

當歸

黃芩

各二兩

芍藥

一兩

蠟皮

燒存性 半兩

牡蠣

煨二兩半

共爲末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高舉

重

又方

產後子宮不開

補中益氣湯加白芍醋附半夏酒芩熱不退加酒

和

外治方

治產後陰腫下脫內出玉門不開



石灰

一升炒極熱

湯二升投灰中適溫冷澄清坐水中

以浸玉門斯須平復如故

又方 療產後陰下脫

燒兔頭末傳之

又方

以鉄精粉上推內之

補遺方 治產後生鴈不收

用枳殼煎湯坐浸良久卽入

又方

草麻子十四粒去殼搗爛塗頂心如收卽洗去

又方

五倍子白礬煎湯浸洗良

乳少類

婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而色帶黃所生之子怯弱而多疾

漏蘆散

療乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯

妳乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內消乳汁通行

漏蘆

二兩半

蛇蛻

十條炙

瓜蒌

十個急火燒焦存性

右爲末溫酒調下二錢服藥後卽以猪蹄炙投之

又方

葵菜子

炒香

縮砂仁

各等分

右爲細末每服二錢熱酒調下茲益氣脉榮衛行

津液極有驗

產寶方

療產後乳無汁

土瓜根

漏蘆各三兩

甘草二兩

通草四兩

右水八升煎取二升分溫三服忌如常法

湧泉散

療產乳無汁亦治乳結癰腫

穿山甲

洗淨一兩  
灰炒燥

右爲細末酒調服方寸匕

鍾乳散

療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少

成煉鍾乳粉

研細

濃煎漏蘆湯調下二錢

靈苑立効方

粳米

糯米

各半合

苡苳子

一合並淘淨

生甘草

半兩

用水二升煎汁去滓三尺直下

羅氏湧泉散

治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬

去心

龍骨

穿山甲

炮黃

王不留行

各等分

右爲細末每服一錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許

吹妳類

產後吹妳者因兒吃妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不

通傷結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳  
若不急治腫甚成癰產後吹妳少若緩治結癰致  
死時或有之速用皂角散括薑散傳以天南星散  
以手揉之則散矣

括薑散

乳香

一錢  
研

括薑

真一  
個

研勻溫酒煎服

天南星散

南星爲末溫湯調以鷺翎蘸塗患處

皂角散

歌曰 婦人吹妳治何如皂角燒灰蛤粉和熱酒  
一盃調八字須臾揉散咲呵呵

又方 治妳結腫硬痛

用百藥煎爲細末每服三錢酒一盞煎數沸熱服

青葉散

青嫩葉葉研細米飲調攤帛上貼之

妬乳類

妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹

捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏卽壯熱  
大渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺卽以手  
將捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿  
熱甚必生癰也 輕則爲吹乳妬乳重則爲癰雖  
有專門不可不知

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹 升麻 芒硝 玄參 芍藥 白蘇

防風 射干 大黃 杏仁 甘草

各錢

右作一服水二鍾煎一鍾食後服



瓜蒌飲 治產後婦乳初結脹不消令敗乳自退

瓜蒌

一個半  
生半炒

大粉草

一寸半  
生半炙

生姜

一塊半  
生半煨

右同剉用酒一碗煮取一盞去滓服之其痛一會  
不可忍卽搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側  
卧於床上令其藥行故也

神應散 治吹乳作癰

葵莖及子 搗篩爲散酒服方寸匕卽愈

又方 療乳腫將次結成癰

右以馬溺塗之立愈

赤龍皮湯

凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃

汁出浸淫爲長百種療不差者動經年月名爲妬

乳

槲皮

三升切

以水一斗煮取五升夏冷用秋冬

溫之分以洗乳

天麻湯

天麻草

五升切

以水一斗半煎取一斗隨

寒溫分洗乳以殺痒也洗畢敷膏散

飛鳥膏散

用燒硃砂作水銀上黑烟三兩

熬令焦燥

礬石

三兩燒粉

右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以傳乳瘡

日三作

又方 治乳頭破裂痛

苧麻根搗傳之愈

又方 取秋後冷落茄子花裂開者陰乾燒存性水調塗之

補遺經驗異症治類

婦人無子非藥可療者二若年命捐尅墳墓不嗣是也病夫病婦疾勞傷氣血并候不調將理失宜

飲食不節乘風取涼冷氣乘虛結於子臟決難有  
孕自少有疾多服熱藥天癸早耗終身無子女人  
血弱子臟冷滯久不生育丈夫勞傷風虛日暗精  
氣不濃精清如水精冷如水不能施化皆宜服藥  
產育正治之外更有異症非經圖所載者今廣諸  
見聞以備症療治

灸法 女人無子及已經生子久不再孕懷娠不成  
者

右以女人右手中指節文一寸五分指向上量之用

草一條是七寸舒足仰臥以所量草自臍心直垂下至草盡處以筆點之此不是穴以原草平摺橫安前點處其草兩頭是穴按之有動脈各灸三壯如筋杪大極有神効

勝金丸

和血溫經

治婦人久虛無子及產前後一切病

患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊胎臨月服五七丸產時減痛婦人無子是子宮冷如服二十九丸男女自至又治積年血風脚手麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐

逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失蓋汗不出  
月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中  
風不語口噤產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈敗血  
上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度血  
痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖  
產後羸瘦凡婦人眾疾不同年深日近並宜服之  
一名金不換治婦諸虛不足心腹疼痛

藥本

當歸

石脂

赤白皆可

白芍藥

人參

白薇

川芎

不見火

牡丹皮

桂心

白芷

白朮

米泔浸

白茯苓

玄胡

各一兩

甘草

山藥

各五錢

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸溫酒化下

初產了用熱醋湯下食前服此方凡婦人懷身便

服此藥甚有神効常服尤妙

溫中龍骨散

濕脫燥濕

治婦人腹下十二經絕產一曰

白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子

藏堅六曰亡漏瘕七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹

寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交

並宜服之

龍骨

三兩

半夏

黃蘗

龜中黃土

桂心

乾姜

各二兩

石葦

滑石

各一兩

烏賊魚骨

代赭

各四兩

白殭蚕

五枚

右治下篩酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭

蚕各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃柏二

兩子藏堅加乾薑官桂各二兩以上多隨病增之

服藥三月有子卽住藥太過生兩子當審方取

好藥寡婦童女不可妄服



小白薇丸

和劑

治婦人衝任虛損子藏受寒久無子

息及斷續不產此由上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路厠太早或久坐濕地或冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面上黧黯齒搖髮落脚膝痛重舉動少力並宜服之

覆盆子

去梗

菖蒲

微炒

遠志

去心

桃仁

去皮尖

白茯苓

去皮

藁本

去苗

卷柏

去根

肉桂

去粗皮

人參

各三兩

白龍骨

川椒

去目并合口者炒出汗

白薇

去苗各一兩

乾薑

炮

細辛

去苗

蛇床子

炒

當歸

去蘆

車前子

芩蘄

各半兩

熟地黃

麥門冬

去心各一兩半

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸蜜心用溫酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子宮除風冷令人有子

烏鷄煎丸和劑

治婦人胎前產後諸般疾患並皆治

之此藥溫經之劑氣血攻補備焉

烏雄鷄一隻

烏藥

石牀

牡丹皮

人參

白朮

黃芪

各一兩

蒼朮

米泔浸切焙一兩半

海桐皮

肉桂

去粗皮

附子

炮去皮臍

白芍藥

蓬莪朮

川烏

炮

紅花

陳皮

各二兩

玄胡索

肉豆寇

木香

琥珀

熟地黃

洗焙

草果

各半

兩

右細判用烏雄鷄一隻湯搦去毛及腸肚

將上件藥安放鷄肚中用新磁瓶以好酒一斗同

煮令乾去鷄骨以油單盛焙乾爲細末煉蜜和丸  
如梧桐子大每服三十丸

胎前產後傷寒蜜糖酒下

胎前氣悶壯熱炒姜

酒下

赤白帶生薑地黃酒下

產後敗血注心

童子小便炒薑酒下

產後血塊填築心腹疼痛

玄胡索酒下

胎前嘔逆薑湯下

催生炒蜀葵

子酒下

安胎鹽酒下

室女經脈當通不通四

肢疼痛煎紅花酒下

血氣攻刺心腹疼痛煎當

歸酒下

血暈櫻櫚燒灰酒調下

血邪研硃砂

麝香酒下

血悶煎烏梅湯研硃砂下

子宮失

冷溫酒或東湯下空心日一服

血風勞人參酒

吞下

小腹疔痛炒茴香鹽酒吞下

血散四肢

遍身虛浮黃腫赤小豆酒下

常服溫酒醋湯任

下並空心食前服

濟陰丹

理氣活血消積

治婦人血海虛冷久無子息及產

後敗血冲心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須

臍生下便得無恙治墮胎腹中攻刺痛橫生逆產

胎衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢一應血

臟有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒熱往來  
遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡  
氣胎曠虛冷數曾墮胎崩赤不定因此成疾室女  
經脉不通並宜服之當曰煖子宮和血氣悅顏色  
退風冷能消除百病

三稜

二雨

蓬木

一雨切片煨

蒼朮

泔浸去皮

枳殼

去穢

大艾

去梗

劉寄奴

香附子

淨

敗薑

各一兩半

烏豆

三合已上九味以穀醋三升煮乾取出焙乾

當歸身

酒蒸

橘皮

去白細紅者佳

白芍藥

各一兩半

蒲黃

隔紙炒

牡丹皮

去骨

官桂

去粗皮

赤芍藥

片薑黃

青皮

去白各一兩

生地黄

酒浸

熟地黄

酒浸

川芎

各七錢半

玄胡索

炒

五靈脂

酒煮

白朮

煨各半兩

左為細末以糯米粉穀醋打糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心沉香湯送下蘇湯鹽湯下亦可

莪朮散

氣養血受旺之源

隨証酌量加入

莪朮

煨

川芎

當歸

熟地黄

酒蒸洗

白芷

茴香

楊芍藥

甘草

各一兩

右爲細末每服三錢鹽酒調下

月水不調勻銀器加灯心 安胎加黃氏生地黃

補虛調氣加生姜紅棗 遍身虛腫加當歸酒

小便不通加滑石末 心虛加硃砂研末調 敗

血冲心腹疼如刀刺燒秤錘紅淬酒如不退五靈

脂酒洗秤遍身疼炒姜酒 吐酸水加丁香七粒

煎湯甚力也空攻眼目浮腫加荆芥 小腹痛加

木瓜艾上惟浮腫用姜湯或葱湯 胃虛惡心加

藿香 冷嗽加葉白皮乾柿 頭痛加川芎細辛



血風潮熱加生薑紅朮 虛汗加麻黃根 吐不

止加青陳皮 血風腰痛加芸薹子搥碎 女人

血結不通手發攣急不知其數薺菜一撮順流水

柳汁下 手足痺痺柳根浸酒 女人血氣成塊

築心銀子灯心 血崩赤白帶真龍骨末好紅酒

調 血風中心狂言亂語渾身壯熱加桃柳枝七

寸 血刺成塊不散菴蘭 女人癖氣膈氣炒茴

香酒 婦人不問虛熱傷風潮熱增寒一切百病

先以三服隨証湯引投之服以他藥調理甚應

冷嗽豬血

心燥猪肝酒

催生順流水滑石禹

餘糧榆白皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯黃柞

葉垂下者

胎衣不下再加茂朮地黃竹青

行

血菴蘭生地黃紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍

藥

婦人病去經調自成妊娠

溫白丸

治婦人病去繼續而生帶下淋瀝五邪失

心憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹

中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦因癸或歌

或哭或如鬼所使以上諸証皆令無子服此藥効

桔梗 柴胡 菖蒲 吳茱萸

湯泡七次焙乾

紫苑

去苗土

黃連

去毛

肉桂

去粗皮

厚朴

去粗皮姜

汁炙

人參

茯苓

皂角

去皮炙

蜀椒

去目并合口者

炒出汗

巴豆

去皮心膜出油炒細研各半兩

川烏

炮去皮臍二兩半

右為細末研勻煉蜜丸梧子大每服三丸漸加至五七丸食後臨卧薑湯送下

琥珀澤蘭煎

和劑

治婦人三十六種血氣八風五痺

亡敝八瘦心腹刺痛中風癱瘓手足痠軟乳中結瘕妊娠胎動胎死不出產永不下降敗血瘵心頭旋

眼花血症四肢遍身浮腫衝任久虛絕產無嗣早  
晚服食或因有子經脉不調赤白帶下惡心嘔逆  
身體瘦倦懷入月一日一服滑胎易產

琥珀

澤蘭葉

牡丹皮

去心

紫巴戟

去心搗米炒

茴香

五味子

去便

五加皮

劉寄奴草

去枝

白芷

川當歸

酒浸

赤芍藥

金釵石斛

去根酒浸

川芎

白芍藥

生地黃

洗焙

熟地黃

洗焙

人參

白朮

附子

艾葉

醋炒糯米糊調成餅焙乾為末各雨

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前用

溫酒磨化服 漏胎刺痛煮糯米飲下 寒熱往

來四肢煩痛煎青蒿酒下 婦人室女經閉煎紅

花酒下 血暈不省人事童子小便和煖酒下

催生鷄子清和酒下 血氣血塊攻刺心腹燒秤

錘淬酒下 傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被

蓋出汗卽愈 心驚悸及頭痛薄荷酒下 咳嗽

煎桑白湯下 血氣攻症渾身瘙癢頭面麻痺炒

黑豆浸酒下 產後產前常服不生諸疾甚効

瘡証 孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨

產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與尋常之藥產後能語則以爲醫之功豈其功也哉

黃帝問曰人有重身九月而瘖此爲何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

治婦人生下孩兒但不能發聲謂之瘖生世俗多不知救深爲可憫今後有此切不可斷臍將胞衣用

火炙令暖氣入兒腹內却取猫一隻用青布袋裹其頭足使一伶俐婦人拏住猫頭向兒耳邊以口着力咬破猫耳猫忽大叫一聲兒卽省開口發聲遂得生矣

又法兒因難產或逆產下不哭微有氣者卽以木父毋真氣度之亦活皆經驗方也